

Abstrak
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Skripsi, 2021

Enggar Teguh Mustiko

Hubungan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting pada balita di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates

Abstrak

Stunting merupakan salah satu masalah kurang gizi yang dapat dikatakan kronis. Hal ini karena kurangnya asupan gizi balita dalam kurun waktu tertentu, umumnya gizi yang kurang tersebut karena pemberian makanan pada balita yang kurang sesuai dengan kebutuhan gizi. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kejadian stunting yaitu tidak diberikannya ASI secara eksklusif saat anak berusia 0 sampai dengan 6 bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates. Desain penelitian ini menggunakan *korelasional*. Jenis penelitian ini menggunakan *metode survei*. H1 pada penelitian dapat diterima jika nilai *p value* <0,05. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates dengan sampel sebanyak 167 responden dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*. Analisis data menggunakan uji *spearman*. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini ibu yang memberikan ASI eksklusif kepada anaknya berjumlah 94 (56,3%) dan anak yang tidak stunting berjumlah 109 (65,3%) dengan *p value* 0,000. Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang artinya ada hubungan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting pada balita di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates.

Kata kunci : pemberian ASI eksklusif, balita, kejadian stunting

Abstrak
MUHAMMADIYAH UNIVERSITY JEMBER
NURSING UNDERGRADUATE PROGRAM
FACULTY OF HEALTH SCIENCE

Thesis, 2021

Enggar Teguh Mustiko

The relationship between exclusive breastfeeding and the incidence of stunting in toddlers in Sempusari Village, Kaliwates District

Abstract

This is due to the lack of nutritional intake of toddlers in a certain period of time, generally the lack of nutrition is due to the provision of food to toddlers that is not in accordance with nutritional needs. One of the factors that can affect the incidence of stunting is not giving exclusive breastfeeding when children are 0 to 6 months old. This study aims to determine the relationship between exclusive breastfeeding and the incidence of stunting in Sempusari Village, Kaliwates District. This research design uses correlation. This type of research uses a survey method. H1 in the study can be accepted if the p value is 0.05. This research was conducted in Sempusari Village, Kaliwates District with a sample of 167 respondents with a sampling technique using simple random sampling. Data analysis using Spearman test. The results obtained in this study were 94 (56.3%) mothers who gave exclusive breastfeeding and 109 (65.3%) children who were not stunted with a p value of 0.000. From the results above, it can be concluded that H1 is accepted, which means that there is a relationship between exclusive breastfeeding and the incidence of stunting in toddlers in Sempusari Village, Kaliwates District.

Keywords: exclusive breastfeeding, toddlers, stunting