

ABSTRAK

Preeklamsia adalah sindrom yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah dan proteinuria, yang muncul pada trimester kedua dan pulih setelah melahirkan. Pre-eklamsia dapat terjadi pada periode prenatal, intrapartum dan postpartum. Pre-eklamsia merupakan salah satu penyebab utama kematian dan angka perinatal di Indonesia. Hingga saat ini, pre-eklamsia masih menjadi masalah keperawatan yang belum terselesaikan. angka kematian di Indonesia masih sangat tinggi, sekitar 810 wanita meninggal akibat komplikasi yang terkait dengan kehamilan atau persalinan di seluruh dunia pada setiap harinya, dan ada sekitar 295 000 wanita meninggal setelah kehamilan ataupun persalinan. tingginya angka kematian ibu disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi seperti perdarahan yang hebat, infeksi setelah persalinan, komplikasi dari persalinan, aborsi dan salah satunya adalah pre eklamsia. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan kasus pre eklamsia berat menggunakan pendekatan proses keperawatan. Metode penelitian ini menggunakan proses asuhan keperawatan. Hasil: terdapat 3 diagnosis yaitu resiko cedera, resiko infeksi, dan resiko ketidakefektifan menyusui. Rencana tindakan dilakukan sesuai dengan standar intervensi keperawatan Indonesia dan juga menyesuaikan keadaan pasien. Kesimpulan: hasil evaluasi semua tujuan tercapai.

Kata kunci: resiko ketidakefektifan menyusui, resiko cedera, resiko infeksi.

Abstract

Preeclampsia is a syndrome characterized by increased blood pressure and proteinuria, which appears in the second trimester and resolves after delivery. Pre-eclampsia can occur in the prenatal, intrapartum and postpartum periods. Pre-eclampsia is one of the main causes of mortality and perinatal rates in Indonesia. Until now, pre-eclampsia is still an unresolved nursing problem. The mortality rate in Indonesia is still very high, around 810 women die from complications related to pregnancy or childbirth worldwide every day, and around 295 000 women die after pregnancy or childbirth. The high maternal mortality rate is caused by several influencing factors such as heavy bleeding, infection after delivery, complications from childbirth, abortion and one of them is pre-eclampsia. The purpose of this study was to analyze and provide nursing care to patients with severe pre-eclampsia cases using the nursing process approach. This research method uses nursing care process. Results: there are 3 diagnoses, namely the risk of injury, the risk of infection, and the risk of breastfeeding ineffectiveness. The action plan is carried out in accordance with Indonesian nursing intervention standards and also adjusts to the patient's condition. Conclusion: the results of the evaluation of all objectives were achieved.

Keywords: Risk of ineffective breastfeeding, Risk of injury, Risk of infection