

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Pengkajian

- 1) Keluhan utama pada 3 klien sama yaitu nyeri pada luka bekas post operasi dengan skala nyeri 6-7
- 2) Usia klien 45-48 tahun
- 3) Riwayat ginekologi pada klien 1 klien mengeluh ada benjolan di perut dan siklus menstruasi 2-3 bulan. Klien 2 dan 3 mengeluh siklus menstruasi < 14-30 hari
- 4) Riwayat obstetrik pada klien 1 klien tidak pernah menikah, klien 2 G1P1A0, klien 3 belum memiliki anak
- 5) Riwayat seksual pada klien 2 dan 3 klien jarang melakukan hubungan seksual karena siklus menstruasi dan lama menstruasi
- 6) Hb klien dalam rentang 9,8-10,7 g/dL (12,0-16,0 g/dL) dan leukosit dalam rentang 12,3 – 15,0 μ L (4,5-11,0 μ L)

5.1.2 Diagnosis Keperawatan

Diagnosis pada penelitian ini diantaranya, nyeri akut, risiko infeksi, gangguan citra tubuh, kesiapan peningkatankonsep diri

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Institusi Kampus

Studi ini dapat menjadi acuan untuk dilakukannya kegiatan pelatihan dalam mengkaji data pada klien mioma uteri

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian tentang pengkajian yang lebih komprehensif dan intervensi apa yang dapat diberikan pada diagnosis yang ditemukan

5.2.3 Bagi Rumah Sakit

Rumah sakit diharapkan dapat mengembangkan formulir pengkajian yang lebih komprehensif dan terstandarisasi khusus untuk kasus ginekologi mioma uteri

5.2.4 Bagi Klien

Klien diharapkan tidak malu dan tidak takut mengungkapkan keluhan berdasarkan tanda-tanda yang ada pada studi ini dan apabila terjadi manifestasi mioma uteri klien dapat segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan

5.2.5 Bagi Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan diharapkan dapat melakukan pengkajian secara komprehensif dan mendiagnosis dengan akurat serta menyusun intervensi dari masalah yang ada