

**ASUHAN KEPERAWATAN MATERNITAS PADA NY. I P1 A0  
POSTPARTUM SPONTAN DENGAN KOMPLIKASI  
KPD DIRUANG KENARI RUMAH SAKIT  
DAERAH KALISAT JEMBER**

**Irma Oktaviana Indriani**

**1701021014**

(Diploma of Nursing Study Program, University of Muhammadiyah Jember)

e-mail: [irmaviana10@gmail.com](mailto:irmaviana10@gmail.com)

**ABSTRAK**

Ketuban pecah dini (KPD) adalah keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum persalinan. Bila Ketuban Pecah Dini terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu disebut Ketuban Pecah Dini pada kehamilan premature. Dalam keadaan normal 8-10 % perempuan hamil aterm akan mengalami Ketuban Pecah Dini (Saifuddin, 2014). Periode Postpartum ialah masa enam minggu sejak bayi lahir sampai organ-organ reproduksi kembali ke keadaan normal sebelum hamil. Periode ini juga disebut puerperium atau trimester ke empat kehamilan. Perubahan fisiologis yang terjadi sangat jelas, walaupun dianggap normal (Diyan Indriyani, 2016).

Tujuan dari makalah ini adalah memberikan asuhan keperawatan secara *Postpartum* pada ibu nifas yang sudah melakukan persalinan, dengan menggunakan pendekatan manajemen keperawatan dan kemudian merumuskan diagnosis keperawatan, menentukan rencana tindakan yang sesuai dan menerapkan secara langsung, dan melakukan evaluasi. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi, studi dokumentasi dan studi literatur. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode studi kasus.

Hasilnya adalah setelah melakukan perawatan pada ibu postpartum dengan KPD selama 3x24 jam adalah ibu tidak ada tanda-tanda infeksi, nyeri berkurang, dan ASI dapat keluar.

Kata Kunci: Postpartum dengan KPD, asuhan keperawatan

**NURSING CARE OF MATERNITY IN NY. I P1 A0 SPONTANT  
POSTPARTUM WITH COMPLICATION OF PREMATURE  
RUPTURE OF MEMBRANES IN KENARI REGIONAL  
HOSPITAL AT KALISAT JEMBER**

**Irma Oktaviana Indriani**

**1701021014**

(Diploma of Nursing Study Program, University of Muhammadiyah Jember)

e-mail: [irmaviana10@gmail.com](mailto:irmaviana10@gmail.com)

**ABSTRACT**

Premature rupture of membranes is the rupture of the membranes before giving birth, if premature rupture of membranes occurs before 37 week's gestation it is called premature rupture of membranes in premature pregnancy. Under normal condition, 8-10% pregnant woman will experience premature rupture of membranes (Saifuddin, 2014). The Postpartum Period is a period of six weeks from when the baby is born until the reproductive organs return to normal before pregnancy. This period is also called puerperium or the fourth trimester of pregnancy. The physiological changes that occur are very clear, even though they are considered normal (Diyana Indriyani, 2016).

The purpose of this paper is to provide postpartum nursing care for postpartum mothers who have given birth, by using a nursing management approach and then formulate a nursing diagnosis, determine the appropriate plan of action and implement it directly, and conduct an evaluation. Data collected by interview, observation, documentation study and literature study. The data obtained were analyzed using the case study method.

The result is that after treating postpartum mothers with early rupture of membranes for 3x24 hours, the mother has no signs of infection, the pain is reduced, and breast milk can come out.

Keywords: Postpartum with premature rupture of membranes, nursing care