

ABSTRAK

Kejadian gagal ginjal kronik di Indonesia kini cukup tinggi. Gagal ginjal merupakan penyakit yang berbahaya jika tidak ditangani dengan segera. Gagal ginjal kronik biasanya akan muncul kelebihan volume cairan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien. Salah satu gejala yang muncul pada kelebihan volume cairan adalah *edema*. Apabila sudah terjadi kelebihan volume cairan dan timbul edema maka harus segera ditangani dengan cepat dan tepat. Penanganan yang tidak tepat pada pasien gagal ginjal kronik dapat mempengaruhi kelangsungan hidup pasien. Untuk itu perlunya penanganan upaya penurunan kelebihan volume cairan guna mencegah pasien menjalani hemodialisa. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan upaya penurunan kelebihan volume cairan pada pasien gagal ginjal kronik di diruang boegenvile rumah sakit umum daerah dr. koesnadi bondowoso. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus, diruang boegenvile rumah sakit umum daerah dr. koesnadi bondowoso pada tanggal 24 November 2019 sampai 26 November 2019.

Kata kunci : *edema*, gagal ginjal kronik, kelebihan volume cairan

